

# INSTRUCTIVO

## BIOPSIA DIRIGIDA POR SONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS



Por favor, siga estas indicaciones:

### ANTES DEL PROCEDIMIENTO

**1** Deberá realizarse al menos **2 días antes** las siguientes :

- PT
- PTT



**2** Deberá traer los resultados de las analíticas el día de la biopsia, así como sus estudios anteriores.

**3** Si usa **aspirina, warfarina, Tic, Plavix, fraxiherapina, Dipridamol, Vitamina E**, debe suspender el uso 10 días antes al procedimiento y 10 días después del mismo.

**4** Si usted es diabético, debe **tomarse sus medicamentos o ponerse insulina**, si la usa antes del examen, y si sufre de hipertensión, debe tomarse sus medicamentos antes de venir a realizarse el estudio.



**5** El paciente puede ingerir una dieta ligera antes de la biopsia.

**6** Deberá venir acompañado el día de la biopsia.



**7** Presentarse puntualmente a su cita.

A continuación, le detallamos algunos que deberá tener en las próximas **48-72 horas**.

**1** De 12 a 14 horas deberá llevar reposo moderado, sin realizar ningún tipo de esfuerzo.

**2** En caso de dolor solo tomar **Acetaminofén 500 mg** cada 6 horas. No ingerir Aspirina, diclofenac o Ibuprofeno.



**3** Mantener área de punción limpia y seca.

**4** Acudirá a la sala de emergencias de inmediato si presenta:

- Dificultad o falta de respiración.
- Sangrado constante (sangre roja abundante) en la zona de la biopsia.
- Salida de pus en la zona de la biopsia.
- Dolor poco usual que no calma con la medicación indicada. Es normal que sienta molestias en la zona de la punción y que aparezcan moretones en el área.
- Enrojecimiento, hinchazón en la herida fuera de lo común.
- Fiebre mayor de 38 OC por más de dos días.

#### RECUERDE:

Si tiene preguntas, no dude en contactarnos:



**809-741-0000**  
**829-471-2617**



o escribirnos al correo

[apoyocemdoe@cemdoe.com](mailto:apoyocemdoe@cemdoe.com)



**CEMDOE**

CENTRO MÉDICO DE DIABETES,  
OBESIDAD Y ESPECIALIDADES