

INSTRUCTIVO BIOPSIA DIRIGIDA POR SONOGRAFÍA DE TEJIDOS BLANDOS



Por favor, siga estas indicaciones:

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

- 1 Deberá realizarse al menos **2 días antes** las siguientes :

● PT ● PTT



- 2 Deberá traer los resultados de las analíticas el día de la biopsia, así como sus estudios anteriores.

- 3 Si usa **aspirina, warfarina, Tic, Plavix, fraxiherapina, Dipridamol, Vitamina E**, debe suspender el uso 10 días antes al procedimiento y 10 días después del mismo.

- 4 Si usted es diabético, debe **tomarse sus medicamentos o ponerse insulina**, si la usa antes del examen, y si sufre de hipertensión, debe tomarse sus medicamentos antes de venir a realizarse el estudio.



- 5 El paciente puede ingerir una dieta ligera antes de la biopsia.

- 6 Deberá venir acompañado el día de la biopsia.



- 7 Presentarse puntualmente a su cita.



CEMDOE

CENTRO MÉDICO DE DIABETES,
OBESIDAD Y ESPECIALIDADES

A continuación, le detallamos algunos que deberá tener en las próximas **48-72 horas**.

- 1 De 12 a 14 horas deberá llevar reposo moderado, sin realizar ningún tipo de esfuerzo.
- 2 En caso de dolor solo tomar **Acetaminofén 500 mg** cada 6 horas. No ingerir Aspirina, diclofenac o Ibuprofeno.
- 3 Mantener área de punción limpia y seca.
- 4 Acudirá a la sala de emergencias de inmediato si presenta:
 - Dificultad o falta de respiración.
 - Sangrado constante (sangre roja abundante) en la zona de la biopsia.
 - Salida de pus en la zona de la biopsia.
 - Dolor poco usual que no calma con la medicación indicada. Es normal que sienta molestias en la zona de la punción y que aparezcan moretones en el área.
 - Enrojecimiento, hinchazón en la herida fuera de lo común.
 - Fiebre mayor de 38 0C por más de dos días.



RECUERDE:

Si tiene preguntas, no dude en contactarnos:



809-741-0000



o escribimos al correo

apoyo cemdoe@cemdoe.com



CEMDOE
CENTRO MÉDICO DE DIABETES,
OBESIDAD Y ESPECIALIDADES